

بروز رفتار جنسی با واسطه برخی فاکتورهای موضعی و احتمالاً پروستاگلاندین F_2 آلفا انجام می‌گیرد.

- مقدمه:

پیشنهاد شده که پروستاگلاندینها در تنظیم رفتارهای جنسی مهره‌داران نقش مهمی ایفاء می‌کنند. بررسیهای انجام شده روی ماهیها نشان داده است که پروستاگلاندینها رفتار تخم‌ریزی و آزادسازی تخمک را در ماهی ماده القاء می‌کنند (۱۰). به علاوه تزریق پروستاگلاندینها در دوزستان ماده رفتار تخمک‌ریزی (۶) و القاء انقباضات شکمی و آزادسازی تخمک را موجب می‌شود (۹). مطالعات اخیر در دوزستان ماده نشان داده است که پروستاگلاندینها مانع بروز جفتگیری و تولید صدا می‌گردند (۶).

سنجش پروستاگلاندین F_2 (PG) آلفا در پلاسمای قورباغه نر طی ماههای سال نشان داده است که سنتز این ماده به سطح استرادیول بستگی دارد و ماده اخیر در فعالیتهای تولید مثلی دخالت دارد (۷). تجاری که روی خزندگان انجام گردیده تأثیراتی متفاوت نشان داده است. در برخی گونه‌ها پروستاگلاندینها مانع بروز رفتار جنسی می‌گردند و در برخی دیگر برعکس عمل می‌کنند (۱۱). پروستاگلاندینها بر گونه‌های پستانداران نیز اثرات متفاوت دارند. در موشها پروستاگلاندین E_2 آزادسازی LH را القاء می‌کند (۵). در هامستر اثر استروژن را افزایش می‌دهد (۴). در موش نر بالغ تزریق پروستاگلاندینهای F_1 و F_2 آلفا موجب کاهش چشمگیر اسپرم‌زایی اولیه طی مرحله تقسیم میوز می‌شود که در نهایت باعث کاهش اسپرماتیدها در مرحله ۷ در مقایسه با جانوران کنترل است و اثر پروستاگلاندین F_2 آلفا از پروستاگلاندین F_1 آلفا شدیدتر است (۱). در انسان پروستاگلاندینها انقباض لوله‌های سمی نیفر را القاء می‌کنند. (۱۲)

از طرفی دیگر برخی مطالعات روی موش نشان داده است که پروستاگلاندین F_2 آلفا ساختار اسپرم را دچار اختلال می‌سازد (۸). هدف تحقیق حاضر بررسی اثر پروستاگلاندین F_2 آلفا بر رفتار جنسی وزغ نر (*Bufo-Viridis*) می‌باشد. همچنین تأثیر پروستاگلاندین F_2 آلفا بر محور هیپوفیز - گناد نیز مطالعه شده است.

اثر پروستاگلاندین F_2 آلفا اگزوزن بر فعالیت‌های جنسی وزغ نر بالغ *Bufo Viridis*

دکتر پروین رستمی - آریتا پروانه تفرشی

گروه زیست‌شناسی - دانشگاه تربیت معلم

- چکیده:

به منظور بررسی اثرات پروستاگلاندینها بر رفتار جنسی و تغییرات بافت بیضه در وزغ نر آزمایشگاهی روی وزغهای دست نخورده و هیپوفیزکتومی شده انجام شد. حیوانات دست نخورده هر یک ۱۰ میکروگرم پروستاگلاندین F_2 آلفا (دوز مؤثر) دریافت می‌کردند. رفتار جنسی در برگرفتن قورباغه ماده در این حیوانات دیده شد در حالی که وزغهایی که پروستاگلاندین $F_2\alpha$ دریافت نکرده بودند، این رفتار را نشان ندادند. ضمناً کاهش قطر لوله‌های سمینفر، همچنین کاهش تعداد سلولهای اسپرم‌زا در مقایسه با حیوانات شاهد در آنها دیده شد. وزغهای هیپوفیزکتومی شده در پنج گروه جداگانه به ترتیب محلول رینگر پروستاگلاندین $F_2\alpha$ ، عصاره هموژنیزه شده هیپوفیز ماده، عصاره هیپوفیز همراه با پروستاگلاندین F_2 آلفا و همچنین HCG همراه با پروستاگلاندین F_2 آلفا دریافت می‌داشتند. نتایج نشان می‌دهد که به جز گروههای اول و دوم در سه گروه دیگر رفتار در برگیری وزغ ماده مشاهده شد. در گروه چهارم افزایش سلولهای اسپرم‌زا و افزایش قطر لوله‌های سمی نیفر دیده شد. بررسی اخیر نشان می‌دهد که پروستاگلاندین F_2 آلفا موجب بروز رفتار جنسی می‌شود و احتمالاً این تأثیر از طریق محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - گناد انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه غده هیپوفیز به تنهایی موجب بروز رفتار جنسی می‌گردد ولی همراه با پروستاگلاندین F_2 آلفا بیضه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر غده هیپوفیز بر بیضه‌ها و

- مواد و روش:

جانوران و نگاهداری آنها:

وزغهای نر به وزن ۴۵-۵۰ گرم در ظرفهای شیشه‌ای به ابعاد ۳۰×۲۰×۶۰ سانتیمتر محتوی آب لوله‌کشی تهران نگاهداری می‌شدند و هر هفته آب ظرفها تعویض می‌شد.

در مدت آزمایش حرارت اطاق ۱ ± ۲ درجه سانتیگراد حفظ می‌شد و جانوران از جگر مرغ تغذیه می‌شدند و از فتوپریود ۱۲ ساعت روشنایی ۱۲ ساعت تاریکی استفاده می‌گردید. مطالعات روی هفت گروه و هر گروه بین ۸ تا ۱۰ وزغ نر انجام گردید.

روشهای جراحی:

وزغهای نر را بادی اتیل اتر بیحس کرده بوسیله مته دندانپزشکی سوراخ کوچکی در ناحیه استخوان کام مجاور محل قرارگیری هیپوفیز ایجاد کرده، غده هیپوفیز را کاملاً خارج ساخته سپس جانوران هیپوفیزکتومی شده بمدت یک هفته پس از جراحی در شرایط آزمایشگاهی قرار داده می‌شدند.

هورمونها و داروها:

برای تزریق به وزغهای نر از غده هیپوفیز هموئیزه شده وزغ ماده استفاده شد. PGF₂α (۱/۱۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) را در محلول رینگر حل کرده و از دوزهای ۵ تا ۳۰ میکروگرم در لیتر برای هر جانور استفاده گردید. سپس دوز مؤثر ۱۰ میکروگرم در میلی‌لیتر برای هر وزغ تجربی انتخاب گردید.

از هورمون HCG به صورت محلول با غلظت 30 IU (از محلول مادر 1500 IU) استفاده شد. تزریقات به صورت درون صفاقی انجام شده است.

روشهای تجربی:

به منظور بررسی اثر PGF₂α بر رفتار جنسی (منظور از رفتار جنسی در این مقاله در آغوش‌گیری وزغ ماده توسط وزغ نر است) و بررسی محور عملکرد آن تجربیات زیر روی وزغهای نر به وزن ۴۵-۵۰ گرم به روشهای زیر انجام گرفت.

۱- حیوانات دست نخورده

۲- حیوانات هیپوفیزکتومی شده

۱- حیوانات دست‌نخورده

در هر گروه ۴ وزغ نر و ۴ وزغ ماده کنار هم قرار داده شده رفتار جنسی مورد بررسی قرار می‌گرفت. گروههای تجربی نر ۱۰ میکروگرم پروستاگلاندین F₂ آلفا دریافت می‌کردند سپس در کنار وزغهای ماده قرار داده شده رفتار جنسی بررسی می‌شد. ۲۴ ساعت بعد حیوانات نر به دنبال بیهوشی کشته شده بیضه آنها خارج و برای مطالعات بافتی آماده می‌گردید.

۲- حیوانات هیپوفیزکتومی شده

وزغهای نر پس از برداشته شدن هیپوفیز به مدت دو هفته در شرایط آزمایشگاه نگاهداری می‌شدند تا اثرات هورمونهای هیپوفیزی موجود در خون از بین برود سپس در پنج گروه به شرح زیر قرار می‌گرفتند.

در هر گروه ۸ تا ۱۰ وزغ مورد آزمایش قرار گرفتند.

گروه اول - هر وزغ تنها رینگر دو زیست دریافت می‌کرد (۱ میلی‌لیتر).

گروه دوم - هر وزغ ۱۰ میکروگرم PGF₂α در یک میلی‌لیتر دریافت می‌کرد.

گروه سوم - هر وزغ عصاره ۲ هیپوفیز هموئیزه شده وزغ ماده را دریافت می‌کرد (تزریق ۲ عصاره هیپوفیز ماده به هر وزغ نر رفتار جنسی را القاء می‌کند).

گروه چهارم - هر وزغ همزمان با عصاره ۲ هیپوفیز وزغ ماده، ۱۰ میکروگرم PGF₂α نیز دریافت می‌کرد.

گروه پنجم - هر وزغ بطور همزمان HCG با دوز 30 IU و ۱۰ میکروگرم PGF₂α دریافت می‌کرد.

در هر گروه به تعداد وزغهای نر وزغهای ماده قرار داده و رفتار جنسی بررسی می‌گردید. ۲۴ ساعت بعد وزغهای نر به دنبال بیهوشی کشته شده بیضه آنها خارج و برای مطالعات بافتی آماده می‌گردید.

مطالعه بافت بیضه و روشهای آماری:

بیضه وزغها را پس از ثابت کردن در محلول بوئن، در پارافین قالب‌گیری کرده سپس برشهای سری عرضی به قطر ۶ میکرون تهیه می‌گردید، برشها در هماتوکسیلین و انوزین رنگامیزی شده با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار می‌گرفتند. در مقاطع بیضه‌ها قطر لوله‌های سمی نیفر در درشتنمایی ۱۰× و تعداد سلولهای اسپرματοژنیک در درشتنمایی ۴× میکروسکوپ نوری اندازه‌گیری و

- بحث و تفسیر:

نتایج نشان می‌دهد که تزریق ۱۰ میکروگرم در میلی‌لیتر $PGF_2\alpha$ موجب القاء رفتار جنسی و آزاد سازی اسپرم می‌شود. کاهش معنی‌دار سلولهای اسپرماتوژنیک مؤید اینست که $PGF_2\alpha$ در تکثیر سلولهای جنسی نقشی ندارد بلکه آزادسازی اسپرم را فعال می‌سازد این امر تأکیدی بر یافته‌های Abbatiello^(۱) روی موش نر است. کاهش قطر لوله‌ها می‌تواند مؤید انقباض سلولهای میوئیدی جدار لوله سمی نیفر باشد که این امر با یافته‌های Yamamoto (۱۹۸۷)^(۱۲) مطابقت دارد. در حیوان هیپوفیزکتومی شده قطر لوله‌ها و تعداد سلولهای اسپرماتوژنیک کاهش می‌یابد که نشانه تأثیر هیپوفیز بر رشد لوله و تکثیر سلولهای جنسی است در اینحال تزریق $PGF_2\alpha$ موجب بروز رفتار جنسی نگردد که نشان دهنده نیاز $PGF_2\alpha$ بر محور هیپوفیزی و گناده و تروپین‌ها برای القاء رفتار جنسی است. نتایج نشان می‌دهد که تزریق $PGF_2\alpha$ در وزغ هیپوفیزکتومی شده بر قطر لوله و تکثیر سلولهای اسپرماتوژنیک بی‌اثر است ولی در تغییر شکل اسپرماتوسیت و تبدیل آن به اسپرماتید و اسپرماتوزوآ مؤثر است. لذا می‌توان پذیرفت که $PGF_2\alpha$ در جهت FSH طبیعی عمل می‌کند.

در اثر تزریق عصاره دو هیپوفیز به حیوانات هیپوفیزکتومی شده افزایش ناچیزی در قطر لوله‌ها و تعداد سلولها و همچنین آزادسازی اسپرم دیده می‌شود که معنی‌دار نیست ولی همین افزایش ناچیز و همچنین بروز رفتار جنسی حاکی از تأثیر گناده و تروپین‌ها در القاء آن می‌باشد.

یا تزریق $PGF_2\alpha$ همراه با عصاره هیپوفیز مشاهده رفتار جنسی و معنی‌دار بودن افزایش قطر لوله‌ها و تعداد سلولهای اسپرماتوژنیک نشانه تشدید اثر هیپوفیز است. می‌توان احتمال داد که $PGF_2\alpha$ عنوان واسطه تأثیر هورمونهای هیپوفیزی عمل می‌کند. از طرفی هم کردن HCG با $PGF_2\alpha$ و مشاهده رفتار جنسی و مقایسه اثرات CG (مشابه با LH) با عصاره هیپوفیز می‌توان به اثرات FSH و LH پی برد یافته‌های Stacy و همکاران (۱۹۷۹)^(۱۰) و Behrman (۱۹۷۲)^(۱۱) مورد اثر $PGF_2\alpha$ بر رفتار جنسی رت‌های نر و ماده یافته‌های ما را تأیید می‌کند. ضمناً محققین مذکور خاطر نشان ساخته‌اند که اثر $PGF_2\alpha$ آزاد سازی LH یک اثر مستقیم بر هیپوفیز نیست بلکه از طریق LHRH و هیپوتالاموس اعمال می‌شود. ضمناً نتایج ما با یافته‌های Alanso Bedate و همکاران (۱۹۹۰)^(۱۳) که به طریق Invitro روی Rana Perezi نر انجام شده و تأثیر GnRH مورد مطالعه قرار گرفته

شمارش می‌گردید و پس از تعیین میانگین با استفاده از آزمون t در صد احتمال P تعیین می‌شد در مورد حیوانات هیپوفیزکتومی شده علاوه بر آزمون t، آنالیز واریانس نیز انجام شد.

نتایج:

۱- در حیوانات دست نخورده (هیپوفیزکتومی نشده) با تزریق ۱۰ میکروگرم $PGF_2\alpha$ پس از ۷ تا ۱۲ ساعت رفتار جنسی (در بزرگی وزغ ماده) و آزادسازی اسپرم مشاهده شد. در حالیکه حیوانات کنترل رفتار جنسی نشان ندادند ضمناً در بافت بیضه وزغهای تجربی نسبت به کنترل کاهش قابل ملاحظه‌ای در قطر لوله‌ها و تعداد برخی سلولهای اسپرمزا (اسپرماتوسیت و اسپرماتید)، آزادسازی اسپرم از لوله‌ها و خارج شدن از حالت دستجاتی (شکل‌های ۱ و ۲) دیده شد.

۲- در حیوانات هیپوفیزکتومی شده

- گروه اول - هیپوفیزکتومی شده کنترل (منحصراً محلول دیگر دریافت می‌کردند): در این حیوانات رفتار جنسی مشاهده نشد و در لوله‌های سمی نیفر آشفتنگی و بی‌نظمی دیده شد (شکل ۳)

- گروه دوم - هیپوفیزکتومی شده با تزریق پروستاگلاندین $F_2\alpha$ آلفا: در این حیوانات رفتار جنسی مشاهده نشد ولی افزایش معنی‌دار در تعداد سلولهای اسپرماتیدی و دستجات اسپرمی نسبت به کنترل مشاهده شد.

- گروه سوم - هیپوفیزکتومی شده با تزریق ۲ عصاره هیپوفیز هوموژنیزه شده وزغ ماده: در این حیوانات رفتار جنسی مشاهده شده. قطر لوله‌ها افزایش یافته همچنین در میزان دستجات اسپرمی کاهش معنی‌دار دیده شد.

- گروه چهارم - هیپوفیزکتومی شده با تزریق همزمان عصاره ۲ هیپوفیز ماده و $PGF_2\alpha$: در این حیوانات رفتار جنسی مشاهده شد. قطر لوله‌ها و تعداد اسپرماتوگونی‌های ۱ و ۲ افزایش نشان داده دستجات اسپرمی به صفر گرائیدند.

- گروه پنجم - هیپوفیزکتومی شده با تزریق همزمان $PGF_2\alpha$ و HCG: در این حیوانات نیز رفتار جنسی مشاهده شد ولی اسپرماتوگونی ۲ و دستجات اسپرمی کاهش معنی‌دار نشان دادند.


(هیستوگرامهای ۱ و ۲ و ۳)

هورمون‌های جنسی نشان دادند که $PGF_2\alpha$ مانند یک مهار کننده فعالیت آندوکربینی بیضه در اواخر فصل تولید مثلی است و از ایجاد لاروهای جوان و غیر مقاوم در فصل سرما جلوگیری می‌کند.


- قدر دان: -

از همکار گرامی آقای دکتر کاظم پریور که در مطالعات هیستولوژیکی از نظراتشان استفاده کردیم و خانم توراندخت بلوچ‌نژاد دانشجوی دوره دکترای فیزیولوژی که در به کارگیری روشهای تجربی همکاری داشتند تشکر می‌کنیم.


است همسویی دارد. محققین اخیر نتیجه گرفته‌اند که گرچه مکانیسم اصلی کنترل عمل گنادها به عهده گنادو تروپین‌ها است معهدا نقش فاکتورهای موضعی دیگر از جمله پپتیدهای شبه GnRH و پروستاگلاندین‌ها را نباید نادیده گرفت. یافته‌های Lopez-Muniz در ۱۹۸۸^(۸) که به کمک میکروسکوپ الکترونی صورت گرفت مؤید تأثیر $PGF_2\alpha$ بر اسپرمیونز موش است که با نتایج ما هماهنگی دارد ضمناً محقق مذکور تغییراتی در ساختمان اسپرم را نشان داده است که بعلت عدم دسترسی ما به میکروسکوپ الکترونی این بررسی روی وزغ انجام نگرفت. نتایج آزمایشات Gobbelti و همکاران (۱۹۹۱)^(۹) روی سمندر آبی ازاد و در اسارت، و مطالعه تغییرات $PGF_2\alpha$ آندوزن و




شکل ۱- مقطع عرضی لوله‌ها سمینیفیر در جانوران کنترل (دست نخورده). ×۴۲۵




شکل ۲- مقطع عرضی لوله های سمینیفیر پس از تزریق ۱۰ mg پروستاگلاندین F_۲ آلفا در حیوان دست نخورده ×۴۲۵




شکل ۳- مقطع عرضی لوله های سمینیفیر در حیوان هیپوفیزکتومی شده. ×۴۲۵



هیستوگرام ۱- مقایسه قطر لوله‌های سمینفر در حیوانات هیپوفیزکتومی شده پس از تیمار با دارو و هورمون‌های مختلف
 Cont = حیوان هیپوفیزکتومی شده بدون تزریق
 PG = پس از تزریق پروستاگلاندین F₂ آلفا
 H = پس از تزریق عصاره غده هیپوفیز، PG+H = پس از تزریق عصاره هیپوفیز همراه با پروستاگلاندین F₂ آلفا
 PG+HCG = پس از تزریق HCG همراه با پروستاگلاندین F₂ آلفا
 * = معنی‌دار بودن با P < 0.05



هیستوگرام ۲- مقایسه تعداد اسپرماتوگونی‌های ۱ در حیوانات هیپوفیزکتومی شده پس از تیمار با دارو و هورمون‌های مختلف P < 0.05 *
 (علائم به کار رفته در زیر هیستوگرام ۱ توضیح داده شده است)



هیستوگرام ۳- مقایسه تعداد سلولهای اسپرماتوگونی ۲ در حیوانات هیپوفیزکتومی شده پس از تیمار با دارو و هورمونهای مختلف
 $P < 0.05$ * (علائم به کار رفته در زیر هیستوگرام ۱ توضیح داده شده است)

References

- 1- Abbatiello, E.R., Kaminsky, M., and Weisbroth, S. The effect of prostaglandins $F2\alpha$ and $F2$ on spermatogenesis. *Int. J. Fertil* 21: 82-88, 1976.
- 2- Alonzo-Bedate, M., Gancedo, B., Delgado, M.J. A direct effect of gonadotropin-releasing hormone on steroid secretion and oocyte maturation in amphibians. *Biology and physiology of amphibians*. 103-115, 1990.
- 3- Behrman, H.R. Effect of synthetic gonadotropin releasing hormone GnRH on ovulation blockade by aspirin and indometacin. *Prostaglandin* 1: 245-58, 1972.
- 4- Buntin, John D. Prostaglandin $E2$ induced lordosis in estrogen primed female hamster. *Physiology and Behavior*, 23: 569-576, 1979.
- 5- Chobisien, G.P. Stimulatory effect of prostaglandin $E2$ on LH release in the rat: Evidence for hypothalamic site of action. *Neuroendocrinology*, 17: 12-17, 1975.
- 6- Diakow, C. Vasotocin, prostaglandin and female reproductive behavior in frog, *Rana pipiens*. *Horm. Behav.* 15: 86-93, 1984.
- 7- Gobbetti, A., Zerani, M., Botte, V. plasma prostaglandin $F2\alpha$ in the male tritus carnifex illaur during the reproductive annual cycle and effect of exogenous PG on sex hormones. *Prostaglandins* 41 (1): 67-74, 1991.
- 8- Lopez-Muniz. Effect of $PGF2\alpha$ (at single dose), *Med. J. Kagoshima Univ.* 38 (1): 193-198, 1986.
- 9- Schmidt, R.S. Mating call phonotaxis in the female american toad, *Gen. and comp. Endocrinology*. 55: 150-156, 1984.
- 10- Stacey, N.E. Central action of prostaglandins in spawning behavior of female gold fish. *Physiol and Behav.* 22: 1191-1196, 1978.
- 11- Tokarz, Richard R. Effects of prostaglandins on sexual receptivity in female lizard *Anolis carolinensis*, *Endocrin*, 109 (2), 1981.
- 12- Yamamoto Masanori. Response of the isolated human seminiferous tubule to prostaglandin $F2a, E, E2$. *The journal of urology*, 137: 345-347, 1987.